

Kweekverslag van de Kleine Karekiet

(Acrocephalus scirpaceus)



INLEIDING

Het verspreidingsgebied van deze vogels beslaat geheel Europa en dan voornamelijk de gebieden waar water en rietvelden te vinden zijn, met uitzondering van het hoge noorden van Europa. Delen van Azië en Afrika behoren ook tot hun verspreidingsgebied. Deze gebieden zijn dan voornamelijk de overwinteringsgebieden. Het is dus een trekvogel die in april ongeveer weer in onze rietkragen te vinden is. De mannetjes arriveren ongeveer 2 weken eerder dan de poppen. Deze twee weken hebben de mannen nodig om hun territorium te bemachtigen. Als ze hun territorium hebben vastgesteld, beginnen ze de poppen te lokken met hun gezang om zo te kunnen paren en vervolgens hun broedsels samen groot te krijgen. Diverse plantaardige materialen worden in hun nest verwerkt dat goed verscholen ligt in het riet. Gemiddeld worden er zo'n 4 eitjes gelegd en deze worden dan in 12 à 14 dagen uitgebroed. De jongen vliegen vervolgens na ongeveer 14 dagen uit. Als de omstandigheden goed zijn, begint de pop al met de tweede ronde, terwijl de man de verzorging van de jongen op zich neemt. De jongen zijn hetzelfde gekleurd als de oudervogels. De kleuren van de vogels zijn hoofdzakelijk in verschillende tinten bruin met daarbij een vaalwitte buikstreep, de poten zijn donkergrijs te noemen. De zang, die vooral de man ten gehore brengt, is eentonig en wordt in serie herhaald. Bij het zingen hangt hij graag in de top van een rietstengel. Het is dus een rietvogel met als bijkomend feit dat ze snelgroeiende nagels hebben net als bijv. exotische rietvogels (Lonchura).

DE KWEEK

De vogels had ik in december overgenomen van een man die wegens gezondheidsproblemen geheel moest stoppen met zijn vogelhobby. Het kleurverschil tussen man en pop is niet zo gemakkelijk te zien. Er zijn wel wat verschillen, d.w.z. het bruin op het rugdek van de man is donkerder dan bij het popje en ook het bruine kapje op de kop. Dit alles kon ik pas constateren. Nadat ik zekerheid over de DNA-analyse had. Hieruit bleek inderdaad dat ik een koppel had.

De pop had ik meteen voorzien van een geel knijpringetje en zodoende kon ik beide vogels beter observeren. De zang van de man was in de broedtijd duidelijk anders dan de roep van de pop, maar dat kon ik op het moment dat ik de vogels in bezit kreeg, nog niet weten. Beide vogels waren correct geringd en de verkoper had mij ook verteld dat het wel hand opfok vogels waren. Dit is voor mij op zich geen probleem, al pas ik dit zelf nooit toe op de door mij gekweekte jongen, puur uit principe. Op zondag 10 april had ik de vogels tegelijk in hun aangepaste kweek box van 23m diep x 1.25m breed x 2m hoog geplaatst. De bodem van deze kweek box had ik ingepakt met silverfolie en op deze manier kon ik een biotoop van water, riet, gele lis en andere waterplanten creëren. Het water werd uit de sloot gehaald, zodat dit meteen leven bezat. De reden hiervoor was dat dit weer



ten goede kwam aan de vogels, want met resetmaat vielen er gedeeltes droog en als dit gebeurde, zag je de vogels in de smurrie wroeten en allerlei beestjes opnemen. Eigenlijk alles wat liep, kroop of vloog, werd verorberd. Het aangeboden voer bestond uit Buffalo- en meelwormen die bepoederd werden met Ayes insectenstrooipoeder. Op 16 mei hadden de vogels hun kunstig in het riet opgehangen nest gemaakt Het bestond hoofdzakelijk uit vooraf door mij gedroogde grasstengels en plantenwortels. Ook werd gebruik gemaakt van de door mij aangeboden pampagraspluimen. De rand van het nest krulde als het ware naar binnen. Ik denk dat dit een veiligheidsmaatregel is zodat de eitjes of jongen er niet uitvallen bij harde wind of regen. Op 21 mei was het eerste ei gelegd, lichtgroen met daarop vlekjes die blauwachtig/grijs waren. In totaal werden er 4 gates gelegd en die kwamen tegelijk tilt op 4 juni. Dus in zo'n 12 dagen zijn de eitjes bebroed. Op een leeftijd van 4 dagen kon ik de jongen met zeer veel moeite ringen met de 2,5mm wettelijk voorgeschreven ringmaat. De poten zijn op deze leeftijd nog wij dik en rubberachtig, maar als ze ouder worden, verbenen de poten en slinken en dan is de ringmaat goed te noemen. Wat opviel, was de gele kleur van de binnenkant van de snavel en in dit geel waren twee zwarte vlekken te vinden. Met een dag of 12 waren de jongen uit het nest en zaten met zijn alien op een rijtje in het riet. Zowel de man als de pop verzorgde de jongen uitstekend De tweede ronde verliep elders. De jonge vogels van ronde 1 had ik uit voorzorg uitgevangen op de dag van het uitkomen van de eitjes van ronde twee. Weer werden er 4 eitjes gelegd, maar hieruit kwamen uiteindelijk 2 jongen tot volledige wasdom. Op deze manier kreeg ik van dit koppel 6 jongen, 100% natuurbroed en wettelijk goed geringd. Bij deze geslaagde kweek was veel gevangen natuurvoedsel nodig in de vorm van vliegjes, mugjes etc.

Bij de dierenzaak kocht ik ook muggenlarven en deze gaf ik dan in een heel dun laagje water in een heel grote bak. De muggenlarven werden hoofdzakelijk de eerste 5 dagen de jongen gevoerd.

Tekst Arie Bakker te Dordrecht

Foto's: Jan de Nijs/Piet Onderdelinden