

Kweek met de mandarijn spreeuw (*Sturnia sinensis*)

In 2003 heb ik deze leuke vogels al eens in mijn volière gehad. Toen is hier geen kweekresultaat uit voort gekomen. Dit lag niet aan de vogels maar meer aan mijn toenmalige volière en de medebewoners. Ik had toen een enkele vlucht met hierin ook driekleur glansspreeuwen. Deze waren de baas en vandaar dat de mandarijnen geen rust hadden. Na mijn verhuizing heb ik een nieuwe volière van aluminium laten zetten. Deze bestaat momenteel uit 3 vluchten van 3x1x2 mtr. De volières zijn voor 2/3 overdekt.

Ik kocht de vogels in 2014 in juni. De vogels waren niet geringd maar ik denk dat ze een jaar of 5 oud zijn. De vogels werden in een van de vluchten geplaatst waar al een paar jonge driekleur glansspreeuwen in zaten. Een broedpoging is dat jaar niet meer ondernomen. Toen alle jonge vogels van vorig jaar verkocht waren hadden ze het rijk alleen. De winter zijn ze goed doorgekomen. Ik ben beperkt in de ruimte dus de vogels hebben geen beschikking over een binnenvlucht. In geval van extreem koud weer heb ik natuurlijk wel mogelijkheden om de volière in te pakken of om de vogels in een kooi van 80x40x40xcm binnen onder te brengen. Maar door de zachte winter heb ik hier geen gebruik van hoeven te maken.

De vogels krijgen als basis voor Orlux premium universeel voer. Met daarbij Unikomplet van Nutribird. Maar deze korrels worden door de

mandarijnen niet zo veel gegeten. Verder krijgen ze regelmatig een stuk appel. Levend voer wordt buiten het broedseizoen met mate gegeven. Zo nu en dan een meelworm maar dan heb je het ook wel gehad. Alleen als er jongen zijn worden er volop levende en/of diepvries insecten gegeven.

Begin maart heb ik een zeshoekig parkietenblok in de volière gehangen. De vogels hadden nog niet zo veel interesse in het blok maar het was nog vroeg in het seizoen. Na een paar weken werd er regelmatig in het blok gekeken door de vogels en werd er rustig begonnen met de nestbouw. Op 21 april werd het eerste ei gelegd. In totaal werden er 5 van die mooie blauwe eieren gelegd. De man en de pop broeden allebei. Wat me opviel bij dit koppel was dat de broedperiode erg kort was. Ik denk dat ze om het kwartier wisselden. Dit heb ik nog niet eerder gezien bij mijn spreeuwen. Maar verder ging het broeden goed en op 6 mei was het eerste jong geboren. In totaal werden er 4 jongen geboren. De levende Buffalo wormen en diepvries pinkies die de eerste dagen worden gevoerd, worden bestrooid met Gistocal voor de broodnodige kalk en vitaminen. Pas na een week worden er wat meelwormen bij gegeven. Bevroren wasmot larven worden niet echt gegeten.



5 eieren



3 dagen oud



17 dagen oud

Na 5 dagen heb ik alle jongen geringd. Een jong heeft zijn ring verloren en helaas heb ik deze niet meer kunnen ringen. De jongen groeiden voorspoedig en op 24 mei vloog het eerste jong uit. De volgende dag gevolgd door de anderen. Helemaal grijs met donkergrijze vleugelpennen. Ze konden al redelijk vliegen. 2 dagen later zat de man plotseling dik en was duidelijk niet in order. Ik heb hem uitgevangen en apart gezet.

De pop moest nu alleen de jongen voeren. Dit ging haar wel goed af en op 1 juni werd het eerste ei van de tweede ronde gelegd. De man was ondertussen wel weer opgeknapt en ik heb hem toen weer terug gezet in de hoop dat hij weer mee ging helpen met het voeren van de jongen en helpen met broeden op het tweede broedsel. Maar hij bemoeide zich hier totaal niet meer mee. Dus de pop zou het allemaal alleen moeten doen. Maar dit heeft ze voortreffelijk gedaan. In totaal werden er weer 5 eieren gelegd deze tweede ronde. Een paar dagen voor het uitkomen verdwenen er plotseling 2 eieren. Ik ver-

dacht de man hiervan en heb deze maar in een andere vlucht ondergebracht. Uit de overgebleven 3 eieren werden ook 3 jongen geboren welke uitstekend door de pop werden gevoerd. De jongen uit het eerste nest zaten nog steeds in dezelfde vlucht. Dit gaf geen enkel probleem. Kost alleen wat meer insecten....

Toen de jongen 2 weken oud waren werd het erg warm in Nederland met temperaturen van boven de 35 graden. Onder een plat dak en in een dicht nestblok moet dit erg warm zijn. Toen ik thuis kwam van mijn werk meteen naar de volière om te kijken of de jongen nog in order waren met deze hitte. Blijkbaar vonden de jongen het ook wel te warm want 2 van de jongen waren uit het blok gevlogen en zaten nog wel erg klein laag in de struiken. Terug zetten heb ik maar niet gedaan want ik denk dat ze dan toch weer heel snel uit het nestblok zouden gaan. Het derde jong was nog kleiner maar die is toch ook de volgende dag uit het nestblok gekropen. Na een paar dagen zaten de jongen hoog in de volière dus dat zou wel goed komen. Helaas is het laatste jong toch te veel achter gebleven en een week later overleden. De resterende 2 jongen zijn verder goed groot geworden. De jongen zijn nu begin september bijna geheel op kleur.

Na deze ronde heb ik het nestblok verwijderd. Een mooi resultaat dit jaar en ik ben erg tevreden met de 6 jongen.

De mandarijn spreeuw is een erg leuke actieve vogel die qua gedrag erg lijkt op onze eigen Europese spreeuw.

Arie Boon

Lid van VV de Volière (D05) - Dordrecht

