

Fok met de Oranjebuikvliegenvanger (niltava sundara)

Toen ik zes jaar geleden bij een handelaar kwam om naar vogels te kijken voor mijn nieuwe volière zag ik een man van de Niltava's zitten. Ik had deze vogels nog nooit gezien en was ook gelijk onder de indruk van de mooie kleuren. Aangezien ik op een paar jaar vogels houden bij mijn vader na geen ervaring had met vruchten en insecteneters besloot ik eerst wat over deze vogels te lezen. Enkele weken later nadat mijn volière klaar was heb ik een koppel van deze vogels gekocht.



Man Niltava Sundara

Het volgende jaar mei had de pop in een kanarienestkastje een nest van mos gebouwd. Hierin werden vier eieren gelegd die na dertien dagen broeden uitkwamen. De jongen werden maximaal vijf dagen oud. Om een lang verhaal kort te maken met het daarop volgende seizoen erbij en enkele nesten later is het oudste jong negen dagen oud geworden. De reden dat deze vogel dood ging was omdat de pop met een nieuw nest begon en niet meer naar het jong omkeek. De man keek niet om naar nestje Ik besloot om met de Niltava's te stoppen en maakte een uitstapje naar de Europese cultuurvogels. De Niltava's gingen naar een vogelmaat en ik ging met redelijk succes Europese cultuurvogels fokken.

Totdat ik vorig jaar besloot om weer terug te keren bij de vruchten en insecteneters op een koppeltje zijzen na. Verder zat er ook nog een koppel Japanse pestvogels in en de nieuw aangeschafte Niltava's. Dat jaar gebeurde er niets bij de Niltava's.

We aangeland in 2004 en is er nog een koppeltje spitsstaartamadines bijgekomen.

In mei zag het er naar uit dat er ook nu weer niet veel ging gebeuren totdat er bij mijn vogelmaat een nest werd gebouwd door de alleenstaande pop. We besloten de pop op een woensdagavond te wisselen. Zodoende had ik mijn eerste pop weer terug. Diezelfde avond begonnen beide vogels naar een nestplaats in de goed begroeide volière te zoeken. Vanwege de grote haast van de pop had ze snel een verlaten nest in een nestkastje gevonden (van de Spitsstaartamadines) waarin zondag al een eerste ei werd gelegd. Er volgde er nog drie die na dertien dagen broeden allemaal uitkwamen. Binnen vijf dagen werden de jongen één voor één allemaal levend uit het nest gegooit. Als pluspunt had ik nu wel dat de man goed meevoerde wat ik in het verleden nog nooit gezien had.

Ook nu begonnen ze beide weer naar een nieuwe nestgelegenheid te zoeken, en die werd snel gevonden. Het werd nu een plaats in de klimop. Met mos werd een mooi nest gemaakt waarin ook nu weer vier eitjes werden gelegd waarvan er na dertien dagen drie uitkwamen. De jongen groeiden goed en werden hoofdzakelijk door de man gevoerd. Na acht dagen begonnen beide vogels weer naar een nieuwe nestgelegenheid te zoeken en dus verwachtte ik het ergste. De pop voerde niet goed dus als ik de man weg zou halen had ik geen hoop op de goede afloop.



Nest met vier eieren

aten al zelfstandig en ik heb besloot ze apart te zetten wat, wat geen problemen opleverde. Na een dagje strand en dus niet de uitgebreide voermethode van normaal vond ik s' avonds twee jongen van het nieuwe nest dood op de grond en de ander volgde de andere dag. Dit was ook gelijk het einde van het seizoen.

Ik besloot de pop weer nestmateriaal te geven zodat alles snel geregeld zou zijn en de man zijn aandacht weer voor de jongen had. En zo gebeurde het ook de pop bouwde een nest lagen er eitjes in en ging weer broeden. De man ging op enkele schitterende baltsen na gewoon door met voeren. Dertien dagen na het uitkomen van de eieren vlogen de drie jongen uit. Ze verbleven eerst veel op de grond waarna ze later elke avond klokslag kwart voor negen uit de begroeiing kwamen om hun vliegkunsten te vertonen. Na ruim een week miste ik een jong die ik dood tussen de begroeiing vond.

Vanaf nu had de pop weer jongen en al snel tolereerde ze de eerste jongen niet meer. Deze



3 jongen

Diverse wetenswaardigheden

De vogels kregen als voedsel universeel voer, pinky's, Buffalo wormen, meelwormen en krekels. Het insectenvoer werd bepoederd met Carmix. In hoofdzaak werden er meelwormen (liefst wit), pinky's en krekels gevoerd. Verder is wel gebleken dat ze bepaalde vogels niet dulden. De Pestvogels die in dezelfde periode ook jongen hadden konden bijna niet bij het voer komen, omdat ze gelijk weggejaagd werden. Dit was ook een belangrijke factor waarom de jonge Pestvogels niet groot geworden zijn. Terwijl er wel jonge sijen en spitsstaart Amandines rondvlogen. Ook is duidelijk geworden hoe belangrijk de man is. De volière die in een L vorm gebouwd is

heeft een oppervlakte van zeven meter en is begroeid met klimop en coniferen. Tevens is er een watervalletje aanwezig. Ook hebben de vogels bewezen de jongen goed te verdedigen. Nadat ik een keer een uitgevlogen jong uit een benarde positie wilde bevrijden vlogen beide vogels steeds luid roepend rakelings over mij heen en zelfs in mijn haren. Alle jongen lijken op de pop, ze hebben ook de witte keelband. Wel is nu ik dit schrijf en de jongen acht weken oud zijn de ene vogel donkerder dan de ander. De vogels heb ik niet geringd om elk risico te vermijden. Misschien volgend jaar!



Jong van zes weken oud